

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施科	報告 日数	備考	外注先
血漿 蛋白	202 5C070	CRP定量 C-反応性蛋白 5C0700000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集法	0.00～0.30 mg/dL	免疫 16	1～2	*1	1
	1405 5C080	血清アミロイドA蛋白 SAA 5C0800000023062	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集法	3.0以下 mg/L	生化Ⅱ 47	3～5	*1	3
	1586 5C010	トランスサイレチン プレアルブミン 5C0100000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	22.0～40.0 mg/dL	免疫 101	3～5		3
	1645 5C020	α1アンチトリプシン 5C0200000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.25(冷蔵)	ネフェロメ トリー法	94～150 mg/dL	血液 80	3～5		3
	1395 5C025	α1酸性糖蛋白 α1-アシッドグロブリン 5C0250000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ネフェロメ トリー法	42～93 mg/dL		3～4		3
	1584 5C030	レチノール結合蛋白 RBP 5C0300000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ラテックス凝 集比濁法	M: 2.7～6.0 F: 1.9～4.6 mg/dL	免疫 129	3～4		3
	1657 5C035	α2マクログロブリン 5C0350000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ネフェロメ トリー法	M: 100～200 F: 130～250 mg/dL	血液 138	3～5		3
	1393 5C041	ハプトグロビン型判定あり 5C0410000023235	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ポリアクリル アミドゲル薄層 泳動法	1-1型 2-1型 2-2型 pg/mL	免疫 129	5～23		3
	1655 5C045	セルロプラスミン 5C0450000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	ネフェロメ トリー法	21～37 mg/dL	免疫 90	3～5		3
	1649 5C060	トランスフェリン Tf 5C0600000023063	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	免疫比濁法	190～320 mg/dL	免疫 60	3～5		3
	1775 5C060	トランスフェリン(尿) 尿中マイクロトランスフェリン 5C0600000003062	5 尿スビッツ	尿 1(冷蔵)	ラテックス凝 集法	0.9以下 mg/g・Cre	尿便 98	3～5		3
	2597 5C134	尿中Ⅳ型コラーゲン 5C1340000006023	備考参照 尿4型コラー ゲン専用	早期第一尿 5(冷蔵)	EIA法	40歳以上: 4.9以下 30歳代: 4.0以下 μg/g・Cre	生化Ⅱ 179	4～9	採取量 4～6mL	3
	2455 5C100	尿中L型脂肪酸結合蛋白 L-FABP 5C1000000001023	5 尿スビッツ	尿 2(冷蔵)	ラテックス凝 集法	8.4以下 μg/g・Cre	尿便 210	3～5		3

*1 血清アミロイドとCRP あわせて実施した場合は主たるもののみ算定する。