

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
自己抗体	1701 5G020	抗DNA抗体定量 5G0200000023002	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	RIA法	6以下 IU/mL	免疫 159	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	1457 5G036	抗dsDNA—IgG抗体定量 5G0360000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 10.0未満 (±) 10.0以上、 15.0以下 (+) 15.0を超える U/mL	免疫 163	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	1118 5G026	抗ss—DNA抗体IgG定量 5G0260000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 159	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	2430 5G065	抗Sm抗体定量 抗SmDp抗体定量 5G0650000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 147	3~5	主な対象疾患：SLE	3
	2743 5G066	抗RNP抗体/半定量 5G0660000023092	1 全血容器(茶)	血清 0.5(冷蔵)	オクタロニー法	陰性 倍	免疫 144	3~5	主な対象疾患：SLE、混合性結合組織病	4
	2431 5G066	抗RNP抗体定量 抗U1—RNP抗体定量 5G0660000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 3.5未満 (±) 3.5以上、 5.0以下 (+) 5.0を超える U/mL	免疫 144	3~5	主な対象疾患：SLE、混合性結合組織病	3
	2432 5G076	抗SS—A/Ro抗体定量 5G0760000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 161	3~5	主な対象疾患：SLE、シェーグレン症候群	3
	2433 5G077	抗SS—B/La抗体定量 5G0770000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 153	3~5	主な対象疾患：SLE、シェーグレン症候群	3
	2434 5G085	抗Scl—70抗体定量 5G0850000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 157	3~5	主な対象疾患：強皮症	3
	2435 5G090	抗セントロメア抗体定量 抗CENP—B抗体定量 5G0900000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 173	3~5	主な対象疾患：強皮症、原発性胆汁性肝硬変 * 1	3
	2436 5G120	抗Jo—1抗体定量 5G1200000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.3(冷蔵)	FEIA法	(-) 7.0未満 (±) 7.0以上、 10.0以下 (+) 10.0を超える U/mL	免疫 140	3~4	主な対象疾患：多発性筋炎/皮膚筋炎 * 2	3
	2479 5G121	抗ARS抗体 5G1210000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 25.0未満 (+) 25.0以上 インデックス値	免疫 190	3~5	主な対象疾患：多発性筋炎/皮膚筋炎 検出対象：抗Jo-1抗体、抗PL-7抗体、抗PL-12抗体、抗EJ抗体、抗KS抗体 * 2	3
	2554 5G122	抗MDA5抗体 5G1220000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 32未満 (+) 32以上 インデックス値	免疫 275	3~6	主な対象疾患：皮膚筋炎 * 3	3
	2577 5G123	抗Mi-2抗体 5G1230000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA方	(-) 53未満 (+) 53以上 インデックス値	免疫 270	3~7	主な対象疾患：皮膚筋炎 * 3	3
	2562 5G124	抗TIF1— γ 抗体 5G1240000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 32未満 (+) 32以上 インデックス値	免疫 270	3~8	主な対象疾患：皮膚筋炎 * 3	3
	2332 5G087	抗RNAポリメラーゼⅢ抗体 5G0870000023023	1 全血容器(茶)	血清 0.2(冷蔵)	EIA法	(-) 28.0未満 (±) 28.0以上、 50.0未満 (+) 50.0以上 インデックス値	免疫 166	3~8	主な対象疾患：強皮症 * 4	3

* 1 抗セントロメア抗体 原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治療方針の決定を目的に用いた場合に限り算定できる。

* 2 抗ARS抗体、抗Jo-1抗体 併せて実施した場合は主たるもののみ算定する。

* 3 抗MDA5抗体、抗Mi-2抗体、抗TIF1— γ 抗体 厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班による「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ELISA法により測定した場合に算定できる。

* 4 抗RNAポリメラーゼⅢ びまん性強皮症の確定診断を目的として行った場合に1回を限定として算定できる。また、腎グリーゼ発症後の者については病勢の指標として測定した場合に、それぞれ3月に1回を限度として算定できる。