

免疫学検査

() は
保存温度

	項目コード	項目名	採取容器	必用量	検査方法	基準値	区分 実施料	報告 日数	備考	外注先
細胞表面マーカー	2537 5I020	T細胞・B細胞百分率 5I0200000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	T細胞 (CD3) 54.3~81.9 B細胞 (CD19) 2.9~20.1 %	免疫 193	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	2234 5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgG 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	0.0~3.8 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgA 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	0.0~4.5 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
	2235 5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgM 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	3.5~17.5 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-IgD 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	2.1~14.4 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-Igκ(κ鎖) 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	2.9~15.9 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
	5I021	B細胞表面免疫グロブリン Sm-Igλ(λ鎖) 5I0210000019662	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	3.1~12.6 %	免疫 155	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可	3
		Singl-color解析による 細胞表面マーカー検査	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ 参照	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3
		Two-color解析による 細胞表面マーカー検査	12 ヘパリン管 (黄)	ヘパリン加 血(黄) 3(室温)	フローサイトメ トリー法	次ページ 参照	免疫 185 (一連)	3~5	月~金・採血日午前中に提出 骨髓検査可 *1	3

*1 T細胞サブセット検査(185点/免疫学的検査) 免疫不全の診断目的に行う検査であり一連として算定する。
造血器腫瘍細胞抗原検査(1940点/血液学的検査)
ア. モノクローナル抗体を用いて蛍光抗体法、酵素抗体法、免疫ロゼット法等により白血病細胞又は悪性リンパ腫細胞の表面抗原又は細胞内抗原の検索を実施して病型分類を行った場合に算定できる。
イ. 対象疾病は白血病、悪性リンパ腫等である。
ウ. 検査に用いられるモノクローナル抗体は、医薬品として承認されたものであり、検査に当たって用いたモノクローナル抗体の種類、回数にかかわらず、一連として所定点数を算定する。

