

# 薬物検査

( ) は  
保存温度

|             | 項目コード         | 項目名                                          | 採取容器          | 必用量           | 検査方法          | 基準値                                                       | 区分<br>実施料  | 報告<br>日数 | 備考                              | 外注先 |
|-------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------|-----|
| 解熱鎮痛剤       | 1836<br>3M205 | サリチル酸<br>3M2050000023041                     | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.4(冷蔵) | 酵素法           | 抗リウマチ薬として150～300<br>(トラフ)<br>μg/mL                        | 特薬1<br>470 | 3～5      | アスピリン                           | 6   |
|             | 1232<br>3L005 | アセトアミノフェン<br>3L0050000023041                 | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.4(冷蔵) | EIA法          | 中毒域<br>4時間 200.1以上<br>8時間 100.1以上<br>12時間 50.1以上<br>μg/mL | 生化Ⅰ<br>180 | 4～7      | カロナール、パラセタモール、<br>ピレチノール<br>* 1 | 4   |
| 不整脈・ジキタリス製剤 | 1901<br>3L800 | アミオダロン<br>3L8000000022204                    | 8<br>ヘパリン管(緑) | 血漿<br>0.5(冷蔵) | LC-MS/MS<br>法 | 投与直前<br>(トラフ)<br>ng/mL                                    | 特薬1<br>470 | 4～7      | アンカロン                           | 6   |
|             | 1225<br>3L897 | プロパフェノン<br>3L8970000023204                   | 8<br>ヘパリン管(緑) | 血清<br>0.5(冷蔵) | LC-MS/MS<br>法 | 50～1500<br>(トラフ)<br>ng/mL                                 | 特薬1<br>470 | 4～7      | プロノン                            | 6   |
|             | 1500<br>3L880 | メキシレチン<br>3L8800000023210                    | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.5(冷蔵) | LC-MS/MS<br>法 | 治療有効濃度<br>0.50～2.00<br>μg/mL                              | 特薬1<br>470 | 4～7      | メキシチール                          | 6   |
|             | 1226<br>3L905 | フレカイニド<br>3L9050000023204                    | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.3(凍結) | LC-MS/M<br>S法 | 治療有効濃度<br>200.0～<br>1000.0<br>ng/mL                       | 特薬1<br>470 | 4～7      | タンボコール                          | 6   |
|             | 1227<br>3L898 | コハク酸シベンゾリン<br>シベンゾリンコハク酸塩<br>3L8980000022204 | 8<br>ヘパリン管(緑) | 血漿<br>1.1(凍結) | HPLC法         | 70～250<br>(トラフ)<br>ng/mL                                  | 特薬1<br>470 | 4～7      | シベノール                           | 6   |
|             | 3L899         | ピルメール<br>3L8990000022210                     | 8<br>ヘパリン管(緑) | 血漿<br>0.2(凍結) | LC-MS/MS<br>法 | 最小有効血漿中<br>濃度0.40と推定<br>μg/mL                             | 特薬1<br>470 | 4～7      |                                 | 3   |
|             | 2556<br>3L802 | ベプリジル<br>3L8020000022210                     | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.3(冷蔵) | LC-MS/MS<br>法 | 250.0～<br>800.0<br>ng/mL                                  | 特薬1<br>470 | 4～7      | ベプリコール                          | 6   |
|             | 1713<br>3L765 | ジゴキシン<br>3L7650000023041                     | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.4(冷蔵) | CLIA法         | 0.8～2.0<br>ng/mL                                          | 特薬1<br>470 | 1～2      | ジゴシン                            | 1   |
|             | 1892<br>3L890 | プロカインアミド<br>3L8900000023041                  | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.4(冷蔵) | HEIA法         | 4～8<br>(トラフ)<br>μg/mL                                     | 特薬1<br>470 | 4～7      | アミサリン                           | 6   |
|             | 1887<br>3L865 | ジソピラミド<br>3L8650000023024                    | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.5(冷蔵) | EIA法          | 2～5<br>μg/mL                                              | 特薬1<br>470 | 4～7      | リスモダン                           | 6   |
|             | 1527<br>3L875 | リドカイン<br>3L8750000023024                     | 35<br>ブレイン管   | 血清<br>0.3(冷蔵) | EMIT法         | 1.5～5.0<br>μg/mL                                          | 特薬1<br>470 | 4～7      | 静注用キシロカイン                       | 3   |
|             | 1175<br>3L896 | ピルジカイニド<br>3L8960000022204                   | 8<br>ヘパリン管(緑) | 血漿<br>0.3(凍結) | LC-MS/MS<br>法 | 0.2～0.9<br>μg/mL                                          | 特薬1<br>470 | 4～7      | サンリズム                           | 6   |

\*1 アセトアミノフェン 同一の患者につき、1月以内に2回以上行った場合は、第1回目の測定を行ったときに1回に限り算定する。