

薬物検査

対象薬剤	入院外来	所定点数	初月加算	4か月目以降	対象疾病
①ジギタリス製剤 ジギタリス製剤の急速飽和	入外 入外	470 740	280 —	235 —	心疾患患者 重症うっ血性心不全
②テオフィリン製剤	入外	470	280	235	気管支喘息、喘息性（様）気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫、未熟児無呼吸発作
③不整脈用剤 プロカインアミド、N－アセチルプロカインアミド、ジソピラミド、キニジン、アブリンジン、リドカイン、ビルジカイニド塩酸塩、プロパフェノン、メキシレチン、フレカイニド、シベンゾリンコハク酸塩、ビルメノール、アミオダロン、ソタロール塩酸塩及びベプリジル塩酸塩	入外	470	280	235	不整脈の患者
④ハロペリドール製剤、プロムペリドール製剤	入外	470	280	235	統合失調症患者
⑤リチウム製剤	入外	470	280	235	躁うつ病患者
⑥バルプロ酸ナトリウム、カルバマゼピン	入外	470	280	470	躁うつ病、躁病
⑦抗てんかん剤 てんかん重積状態の患者に対して抗てんかん剤の注射などを行った場合	入外 入外	470 740	280 —	470 —	てんかん患者 全身性けいれん発作重積状態
⑧バルプロ酸ナトリウム	入外	470	280	235	片頭痛
⑨サリチル酸系製剤（アスピリン他）	入外	470	280	235	若年性関節リウマチ、リウマチ熱、関節リウマチ
⑩メトトレキサート	入外	470	280	235	悪性腫瘍の患者
⑪エベロリムス（抗悪性腫瘍剤）	入外	470	280	235	結節性硬化症の患者
⑫イマチニブ	入外	470	280	235	当該薬剤の適応疾患（慢性骨髄性白血病など）
⑬シクロスポリン	入外	470	280	470	1.ベーチェット病の患者であって活動性・難治性眼症状を有するもの 2.その他の非感染性ぶどう膜炎（既存治療で効果不十分で、視力低下のおそれのある活動性の中間部又は後部の非感染性ぶどう膜炎に限る。） 3.再生不良性貧血、赤芽球病、尋常性乾癬、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚炎（既存治療で十分な効果が得られない患者に限る） 4.ネフローゼ症候群、川崎病の急性期
⑭タクロリムス水和物	入外	470	280	470	全身型重症筋無力症、関節リウマチ、ループス腎炎、潰瘍性大腸炎又は間質性肺炎（多発性筋炎又は皮膚筋炎に合併するものに限る。）の患者
⑮免疫抑制剤 シクロスポリン、タクロリムス水和物、エベロリムス、ミコフェノール酸モフェチル	入外	470	臓器移植後 3月まで2740	470	臓器移植後の免疫抑制
⑯アミノ配糖体抗生物質 ゲンタマイシン アミカシン トブラマイシン アルベカシン グリコペプチド系抗生物質 テイコプラニン	入	470	280	235	表記の薬剤を数日間投与している入院中の患者（外来は不可）
グリコペプチド系抗生物質 バンコマイシン	入	470	530	235	表記の薬剤を数日間投与している入院中の患者（外来は不可）
⑰トリアゾール系抗真菌剤（ポリコナゾール）	入	470	280	235	重症又は難治性真菌感染症（外来は不可）又は造血幹細胞移植（深在性真菌症の予防を目的）
⑱シロリムス製剤	入外	470	280	235	リンパ脈管筋腫症の患者
⑲スニチニブ	入外	470	280	235	腎細胞癌の患者
⑳治療抵抗性統合失調症治療薬（クロザピン）	入外	470	280	235	統合失調症患者